

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之四

宋燕山竇

明三衢大

目錄 凡三十二症

手心毒圖說

方二

手腕毒圖說

方二

腕疽圖說

方二

蠅蛄三串圖說

方四

發膊圖說

方一

遊丹圖說

火赤瘡圖說

方二

發背圖說

方一

魚脊瘡圖說

方二

散走流注發

圖說

方三 背發兩頭圖說

腎俞發圖說

對心發圖說

方二

蜂窠發圖說

方一

經體發圖說

連子發背圖說方上中下三搭手圖說 連珠發方三圖說

上中下三發背圖說 對臍毒圖 腰疽圖說

痰注如袋形圖說方四 暑疔圖說方六 青疔圖說

黃疔圖說 亦疔圖說 白疔圖說 黑疔圖說

芝蔴疔圖說 氣疔圖說 冷疔圖說方一

魚臍疔圖說方五

重校宋寧太師瘡瘍經驗全書卷之四

圖論方

手心毒與手背毒同治



此毒右手受在陰火太陽陽明氣血流于左足厥陰經

左手毒在心火太陽流于右足太陰陽明土復生流于
五行子母更相生養或因喜怒憂思寒凝氣血阻滯不
通結聚成毒當用定痛解毒之劑

紫蘇 芍藥 甘草 桔梗 枳殼 烏藥 白芷

防風 羌活 獨活 川芎 茯苓 黃芩 薄荷

乳香 威靈仙 右水姜三片煎服

后用內托流氣飲人參 木香 乳香 當歸 川芎

黃芪 芍藥 防風 甘草 厚朴 枳殼 桔梗

烏藥 白芷 檳榔 紫蘇
姜三片藥一丸煎服外
用金龜散敷之

手腕毒



此毒受在掌后因心經風寒喜怒驚風痰盛血不流通

結成此毒當用定痛敗毒散內托清氣飲或透手心或透腕外再用三香內托散治之
定痛敗毒散

白芍 白芷 乳香 末 桔梗 枳殼 防風 當歸

羌活 茯苓 甘草 薄桂 靈仙 木通 金銀花

姜三棗一煎服 夏天加黃芩

內托清氣飲 人參 黃芪 紫蘇 桔梗 金銀花

枳殼 青皮 甘草 厚朴 川芎 防風 天花粉

木香 羌活 當歸 芍藥 煎同前

臃疽



此毒生于五肋下三指初起如落日漸長大如枕即時

就成水達皮週圍攻結成膿形如蠱脹肚無青筋而臍
不凸只是癰脹便服二十四味流氣飲 猪苓 茯苓

霍香 砂仁 桔梗 枳實 厚朴 澤瀉 陳皮

紫蘇 當歸 青皮 香附 枳殼 赤茯苓 檳榔

木瓜 川芎 赤芍 黃芪 甘草 肉桂 木香

肉菴水煎空心服只可一服不可再服 然後用

內托散 桔梗 厚朴 白芷 防風 人參 黃芪

香附 陳皮 川芎 甘草 官桂 當歸 赤芍

金銀花 或加木香 行藥用腸瀉方

蜈蚣三串



蜈蚣三串上下三種因受濕毒傷于膚氣血傷于腎怒

氣傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也用沝氣飲

紫蘇 桔梗 枳殼 烏藥 甘草 芍藥 白芷

川芎 防風 厚朴 木瓜 香附 官桂 川棟子

水二鍾姜三片棗一枚不拘時服

三香內托散

人參 黃芪 當歸 川芎 芍藥 甘草 乳香

烏藥 防風 官桂 厚朴 桔梗

姜三片棗一枚水煎溫服

又方 紫蘇 枳殼 桔梗 甘草 赤芍 防風

當歸 川芎 羌活 厚朴 茯苓 前胡 生地
白芷

姜三片 棗一枚 不拘時服

熱加 柴胡 陳皮 半夏

定痛降氣飲

芎藭 白芷 細辛各二兩 僵蚕 五錢 生用

右為細末 煉蜜丸 每服一丸 清茶嚥化

治法同三串及諸癰疽

發膺

五相堂新編四卷

六



蓋陽乃少陽經多氣少血厥陰因少陽有相火尤甚于厥陰皆由多慮勞神六氣七情相感頭宜防肌肉難長暴戾之真勿輕用之

一人右脅外側生一結核身微寒熱易怒平居奉養甚厚診其脉俱浮大弦數重按似瀉皆因憂慮傷血時在初秋切勿輕視宜急補以防變証宜人參一觔作膏和淡竹瀝服之方保無虞奈病家吝費求他醫治之以十宣五香相間服之旬日右忽大風拔木病者發熱神思不佳其核即稍高大似有膿狀外腫起紅線延至肩後

趨背脊入左脇下不痛肩背重急食欲嘔急服人參膏
入川芎生姜汁服盡三觔而安然瘡潰濃乾又以四物
湯加人參白朮陳皮炙草生姜水煎服數劑而安此病
生于春令甚難療者幸生在秋不幸暴風大作激起木
中相火非人參川芎膏驟補何由得生也

人參四兩川芎一兩生姜五錢

右剉片水四碗煎至一碗去渣重湯熬膏每次知之
臨服加竹瀝


但此症之發紅腫或如粟勿以小而忽之

遊丹



遊丹者即遍身丹毒也初發兩手青腫微上下急急痛
若經一宿二宿瘡氣遍身入心內腫即死初發急治之
宜服五香連翹湯木香流氣飲以金箍散敷之宜用治
疔之法治之

火赤瘡



火赤瘡者氣血虛殘邪毒攻發初生赤色燎漿走徹成

膿生泡黃水時出沾破皮膚或如火燒疼痛須用清肌
解毒消邪熱降肺火補腎水之劑治之

犀角

甘草

乾葛

山梔

黃連

黃芩

夏天倍加

白朮

粘子

歸頭

川芎

赤芍

黃柏

知母

荊芥

薄荷

青皮

桔梗

蟬脫

石膏蒲

天花粉

清涼膏

黃連黃芩山梔薄荷甘草桔梗枳殼煎數沸

去粗加冰片射香各三分鵝毛掃上指日得愈

紫金錠水磨塗之

發背



太師明指發背論

發背之生積毒臟腑正氣盛滯留停緩元氣虛朝輕
夕重如發弓矢外小內大內托則生敗毒則斃治法
以參芪為主一定之論百世不易凡癰發于背廣一
尺深可一寸雖潰至骨不穿膜不死此症六氣七情
或因飲食而感其毒積于脾肚之間用藥先消脾肚
中之毒內外夾攻斯無患矣

發背癰疽惡毒

人參

黃芪

當歸

白朮

各五錢
橘紅一錢
五分

右剉水煎入竹瀝姜汁和勻服之如欲煎膏加參芪等藥各四兩

腫瘍加當歸連翹羌活

潰瘍加芍藥川芎甘草白芷

酒毒加酒炒黃連

氣加炒香附

痰加瓜蒌仁

發熱加酒炒黃芩

渴加麥冬天花粉

惡心加半夏生姜藿香

解毒加金銀花甘草節

瀉加蒼朮白朮俱土拌炒

在太陽上加羌活


在少陽上加柴胡

在陽明經上加鼠粘子白芷升麻

魚脊瘡

五桂堂精選四卷

十一



魚脊瘡者職事積勞腎氣虛寒故虛熱得傳經筋筋骨

之間發動不知何處初生如疽癰破時黃水流生白泡
似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保先服神功活命
湯次用歸芪調榮湯或參芪肉托散

當歸 川芎 生地 白芍 連翹 黃柏 知母

茯苓 甘草 升麻 白朮 桔梗 黃芩 獨活

青皮 白芷 苦參 天花粉

休虛加參朮減苦參連翹

外用解毒潤肌散搽之或用金絲膏貼之

洗用豬蹄煎湯

或用地骨皮煎湯尤妙

散走流注發



太師指明散走流注發

大凡氣血不調經絡不通復感六氣七情故毒氣乘
風熱而走是也此症因風盛而生熱之証熱極氣盛
氣因熱之極而走于四散急宜疎風定熱則氣自然
而息若元氣盛初發者速以艾灸七壯四圍敷藥內
服二十四味流氣飲無不愈者若流注于手脚腿者
死無疑矣

妙貼散

白芷

錢五

南星

錢五

肉桂

錢五

蛤粉

錢五

五倍

一兩

芍藥

七錢

七錢

多年小粉

八兩

白芨

四兩

右磨末每用生姜自然汁好醋葱蜜搗汁和勻火上熬熱調藥如糊敷四向空中出毒乾再用前汁潤之以助藥力

加減二十四味流氣飲

陳皮

半夏

升麻

乾葛

甘草

澤瀉

茯苓

蒼朮

厚朴

木香

羌活

獨活

防風

荊芥

薄荷

黃芩

川芎

當歸

生地

白芍

黃芪

青皮

木通

白芷

冬天加紫蘇大柴胡水二鍾姜五片葱白三根煎熱服以衣覆患上出汗為妙止可一服

參芪內托十宣散

人參

一錢五分

黃芪

二錢

陳皮

八分

甘草

三分

升麻

一錢

茯苓

一錢

白朮

澤瀉

二錢

當歸

二錢

川芎

生地

白芍

黃芩

天花粉

烏藥

前胡


黃柏

知母

冬天加桂

倘有餘內症因症加減全在活法施治

背發兩頭



五桂堂精選四卷

古

此症兩頭小者曰遠散攻乃因飲酒休虛之所致也而
氣食相鬪合陰虛而成之氣虛而散所以開口而關急
服內消藥亦宜補陽也治法與發背有瘡同前方加減
服之

腎俞發

三才圖會卷之五

一四



腎俞之發傷於人難知識因受暑濕并怒熱飲熱酒而
得之傷于內腎之間流毒在腎急用解內留之毒內外
攻之若醫緩傷膜者難生矣切戒怒氣行在利或一犯
決不可治

治法同發背瘰癧而補腎加黃柏知母乳香沒藥廣膠

對心發此症難治

為癰疽者死



心者君主之官神明出焉恬澹虛無病安從來心有佛

諸病生焉發于手足者皆由于心火故發于心乎此
症乃對心發因心火然而熱氣會生于此處其毒愈感
急用疎導心火之藥解之用意調處若合兵法方生
機必須戒性若一怒不能生矣發于心之側者亦可治
黃連解毒湯

黃連

姜汁炒

甘草

升麻

桔梗

茯苓

黃芩

酒炒

山梔

當歸

川芎

白芍

生地

枳殼

玄參

天葵

連翹

小柴胡金銀花

灯心臨服加犀角汁服四

劑后宜加人參


護心散

蠟丸九日夜服之

地珠發

三才圖會

二



此疾若陰囊赤腫小便不通小腹脹痛此疝氣也急過
度及醉飽房事以傷腎水得此疾者必致成事令人口
乾身發寒熱百節皆疼治方于後

十奇散 治發背傷于腎者

桔梗

人參

歸身

天花粉

五味子

芍藥

烏藥

香附

枳殼

木香

囊腫加

川棟子

枳榔

百節疼痛加木瓜

牛膝

赤芍

寒熱加

柴胡

黃芩

酒煎散 治發背因毒內攻其毒與好肉一般平者用手按之如牛頸之皮上有黃泡出膠水乃毒入于肺若不速治即死

當歸

穿山甲

炮

白芷

升麻

肉桂

木香

川芎


赤芍

甘草

酒煎服

或患處好肉四邊紅腫其色如火用磁鋒刮去惡血即用鷄子清調乳香木敷之時時用芭蕉根汁潤之以助藥功

蜂窠發



此疾若肉黑色青色中大陷四圍硬肉亦紫色風毒氣傷于腠理可發出即生不發出即死此毒因膏粱之味溫牀厚被醉飽房事以致五藏積毒不流積而為癰則心神恍惚夜夢不安小便頻數大便澹泄此疾串于左脇即死治方于後

內托十宣散

人參	黃芪	白朮	當歸	白芍	厚朴	白芷
川芎	連翹	官桂	桔梗	防風	甘草	荆芥
金銀花	水二鍾煎八分食前連進十貼					

虛其者加附子

心神恍惚夜夢不安加遠志辰砂酸棗仁

大便滯泄加黃連木香白朮上炒蒼朮

內陷不發加穿山甲乳羊角燒灰

小便頻數加薏苡仁益志

膿不透加歸須地蜈蚣炙赤芍藥

連服蠟丸九日進五服

膿將透便服排膿內補十宣散即內托散

加木香穿山甲 仍貼金絲膏

經體發

五桂堂精選四卷

三

氣針

取膿針




此毒因暑熱之時空心受其穢氣以致胃氣仍敗則致
嘔逆如若不治毒氣入內則難生矣急服乳香托裏散
再服五香連翹散蠟丸外貼金絲膏

內服忍冬酒一日三服忍冬酒方具前

連子發背

日本小治政通日表

二



此疽發于右胛中恐其毒氣奔入心大要引藥散之付
圍藥點截住不令攻心如在中道通于背皆腫不可救
也消者可療諸瘡痛痒皆傷于心以心生血而行氣之
痛諸瘡皆有數藥就上下打大針三四針為妙用前化
毒消腫散千金內托散多加參芪

圍藥

南星

草烏

木鱉

貝母

大蒜

白芨

五倍

生

生姜

取汁

米醋


調付留口二三日夜即消盡矣常以醋潤之

護心散蠟丸丸時刻不可缺

中下三捲手

日本古書集成


三



上中下三搭手受在五藏六府毒熱憂怒氣逆傷于腦
經結聚成毒此是惡症也當用腦疽發背癰疽等藥治
之


園藥亦然 時進忍冬酒蠟丸

上巾下三發背



上發背受在陶道經主傷于肺肝心經驚悸結聚怒氣
傷肝壅出背毒此乃惡毒症也先用敗毒流氣飲次用
護心托裏散後用內托流氣飲治之敗毒流氣方在後
又并護心托裏散流方于後 中發背受在神堂靈道
經正心毒心血湧出不能歸肝氣血壅在背中損于肝
經此乃惡症當用煎藥治之敗毒流氣飲方在後
下發背受在脾肝經絡凝滯于五藏傷于三經此是三
毒之症也先用敗毒流氣飲后用人參內托散外用圍
藥敷之

對臍毒一名衝疽



右各為細末和勻用生姜自然汁一碗好醋一碗葱
半觔搗爛加蜜三兩再搗取汁半碗三和勻火上
熬熱調藥俟通手數患上留一小洞出氣時用熱餘
汁潤之一日夜方可易之敷至一月方得軟矣亦可
下行劑

人參內托散

人參	二錢	白朮	二錢	陳皮	一錢	半夏	一錢	芥子	一錢
黃芪	一錢	茯苓	一錢	當歸	一錢	川芎	一錢	白芍	一錢
黃芩	一錢	蒼朮	一錢	香附	五分	麥冬	五分	枳實	五分

黃連五分 桔梗一錢 青皮八分 烏藥一錢 天花粉一錢五分
防風七分 甘草四分 升麻一錢 厚朴一錢 姜汁拌炒
加減存乎人

右作一劑姜五片砂仁末五分煎臨服加淡竹瀝姜
汁半酒杯和服之服至百劑方愈

神仙救命丹 待硬處活動如綿煎劑服大半方可下
之否則無益有損

珍珠一錢 射香一錢 冰片三分 胆星末五錢 甘草末一錢
枳實一錢 蟾酥六分 巴豆霜五錢 全蝎末一錢 蛤粉一錢

右各為細末和勻米粉糊為丸如桐子大每服三錢
 空心或酒或蜜湯送下其痰從大便中出盡為度如
 不行再服即行以薄粥補之若不待其軟遂下行藥
 命亦難生病者須要拱聽醫師之戒清心寡慾戒惱
 免憂并忌油膩生冷蒜茄等物如瀉不止另又一方
 甘草 七分 黃連 一錢五分 蒼朮 炒二錢 白朮 二錢土炒
 猪苓 澤瀉 一錢 車前子 炒芍
 炒苓 茯苓 一錢五分 人參 蓮肉
 右水二鍾姜三棗二煎服即愈

又方早辰頭一吊井華水
 冷飲一酒杯其瀉立止

暑疔



大抵疔瘡有十三種而有青黃赤白黑所以應五臟也
復有暑疔火疔氣疔冷疔者皆以其時候緩急浮實之
異但初發起或先后痛先寒后熱四肢拘急沉重強痛
者得症便發寒熱瘡邊麻漸至半身大痛應心嘔逆自
利足冷至膝四畔紫黑色皆為重症惟麻子始末皆痒
若症候寒熱與諸疔瘡同俱覓背強其痛甚者乃觸犯
所致即取枸杞根搗汁服之弥佳再狗屎白色者得而
露之功臭氣已去加枸杞根和勻絞取清汁服之尤良
但有卒患喉痛心寒熱或腹痛惡寒發熱者當預防生

此疔症也凡疔瘡多生口邊頰內或舌上赤黑點點如珠碌痛應心者是也不即治之日夜根長流入諸脉如箭入身不得動搖經五六日后甚者毒氣入腹眼中見火神昏煩悶嘔吐恍惚如醉如痴不可療矣疔瘡有頭黑硬而凹者瘡頭白而腫實者瘡頭如豆莖色者瘡頭鮮紅色者瘡頭內有黑脉者瘡頭紅赤而浮虛者瘡頭如梳而黃者瘡頭如金箔者瘡頭如菜葉者瘡頭如石榴子者有初如風疹粉刺搔破入風則去黃水出其裏有赤黑脉而微腫者肉中突起如魚眼赤黑慘痛徹

骨者結久皆爲爛瘡瘡下深孔如大針穿物初生時
起疔痂故名疔瘡令人惡寒發熱四肢強直而疼痛一
二日瘡便變色焦黑腫大光起根硬不可近犯之則痛
甚則發于頭面手足骨節間者氣血之所聚會宜急治
之有似灸瘡四邊泡漿者但疔瘡熟時膿水出瘡孔如
蜂巢病易瘥也疔瘡惡症眼黃面青舌黑冷汗發渴脚
冷至膝下不食自利瘡冷不痛嘔逆瘡不起發四畔不
紅瘡邊麻木乾黑生刺瘡邊紫黑色疼痛應心眼中見
火神昏煩悶神思恍惚猶如醉痴者皆難治也試以針

刺患人手足中指不痛者難治疔瘡初生時紅軟溫和
忽然頂陷黑謂之癰走此症危矣急服飛龍奪命丹追
疔奪命湯其疔發于太陽眼邊者名曰釘腦疔十死一
生內經以白疔發于右鼻赤疔發于舌根黃疔發于口
唇黑疔發于耳前青疔發于目下蓋取五色以應五臟
各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在
頭面手足骨節間者甚急

拔疔要法

妙法傳于後世

來學貴乎心求

不可妄治以傷生

不可過時而難療

凡疥瘡之起多發于嘴唇上邊初如米大或粉料搽入湯火風氣亦要變成疵瘡疵瘡者即疥之別名也先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛熱酒半碗過下以衣覆患上略出汗為妙上午服藥下午即將絕利磁鋒劃破瘡口十字即搽飛龍奪命末在內而外用蟾舌研爛蟾肚底皮貼之內服追疔湯劑若發于鬚髮者即剃去鬚髮如前法治之此法靜夜細思試而行之百發百中活人多矣焉敢自秘遂并梓行病人一月內無色慾者患處平妥無弩肉乃其徵也

此法系精思所得百發百中切勿輕視之
妻談謹述

追疔奪命湯 服之速効能內消腫

羌活 獨活 青皮 防風 附子 黃連 天花粉

赤芍 細辛 蟬脫 殭蚕 桔梗 金銀花

歸稍 川芎 白芷 連翹 山梔 甘草節

在脚加木瓜牛膝薏苡仁 一方加澤蘭一錢生薑

十片葱三莖煎服以衣被覆之出汗為妙

外用鹿耳白丸火土熬和碾末鷄子清調敷之

又方用蜈蚣虫鵪鶉敷瘡上能拔疔根

此治疔毒

當歸

川芎

赤芍

荆芥

乾葛

烏藥

白芷

獨活

升麻

羌活

青皮

蟬脫

甘草

防風

枳殼

紅花

蘇木

瘡疼加乳香沒藥

瘡熱不退加淡竹茹山梔仁

腫不退加甘草節降真香節

眼昏加川芎白芷荆芥防風蔓荊子

渴加天花粉乾葛

冬麥

小便閉加滑石末車前子

右水二鍾烏豆十粒煎服病在上食后服病在下食

前服

芎藭散

治急慢疔瘡

本草云益母草味辛甘微寒無毒搗其莖葉以傅疔腫服其汁以使疔腫內消隨處有之多生背陰地四方莖梗對節生葉嗅之畧臭節間生紅白花四五月採之陰乾

益母草一味燒存性為末先以小鑱刀十字剖破疔瘡根至痛處令出血次繞疔根出血捻盡惡血拭乾以稻草心蘸益母草灰摵入瘡孔中適傳到底良久當有紫黑血捻出令盡拭乾再摵入前藥見紅血則

止一日夜三五次重者三日根爛出輕者一日止
瘡根盤腸根出即瘡根起也針挑出之雖其不出其
根自爛無憂矣內服救生奪命丹如無則服忍冬酒
日夜服之并服追疔奪命湯若得此症便發寒熱半
身麻木嘔吐不食其痛應心者甚急三五日便死急
用小刀劃斷疔根出血令盡若有疔發于三四處只
去先發為要其餘即無害矣如前治之若陽症形體
壯者實者以鋒針刺瘡四邊多出血以洩毒氣針刺
所屬經絡而瀉之暑濕忌風寒房事酒肉魚腥蒜椒

三才圖會卷之三
三三二
辛辣油膩粘滑生冷狐臭息香射香湯火氣

又方用蒼茸草野菊花二味搗汁和酒服之微醉患處以衣覆之睡一時痛定熱除矣

又方魚腥草搗汁和酒服之相付患上

疥瘡頭面碧綠色者不可用針刀出血畧挑開靨付入益母灰又搗益母汁服之更妙

又有日久潰爛者不可用針出血只以鑱刀割去腐肉以益母草灰付之

護心散

疥瘡煩燥作渴惡毒攻心

青鼈

二兩

雄黃

五錢

射香

少許

蒼耳灰

二錢

右為細末每服二錢蜜水調下

一疔瘡生根入股者便死川磨針刀缺漿水一碗絲綿
濾淨銀鍋內煎三四沸服之瘡者須臾腸鳴行利一
二次甦醒方可

一疔瘡不破則毒入腸胃惟蟬殼極効以一兩為末蜜
調下

救疔散

面粉

射香

人耳中膜

各等分

右為末葱涎搜膏連帛貼患處其瘡根盡拔出

凡疥瘡發于頭面上者切不可用冷藥敷之若敷冷藥
趕熱毒惡戾之氣入于喉間斷不能生矣

疥瘡有十三種

一曰麻子疥其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多
痒忌食麻子油及芝麻并着麻衣并入麻田中行走
二曰石疥其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉
微痛忌瓦礫磚石之屬

三曰雄疥其狀炮起頭黑靨四畔仰炮聚起有水出色

黃大如錢孔形狀高厚、

四曰雌疥其狀瘡稍黃白裏屬亦似灸瘡四面起漿起心凹色赤如錢孔

五曰火疥其狀如湯火燒灼瘡頭黑屬四邊有烟漿又如赤粟米者忌火燒烙

六曰爛疥其狀色稍黑有日班瘡瘡中潰有膿水流出瘡形大小如匙面者忌食熱物

七曰三十六疥其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十餘若滿三十六藥不能

治未滿可治

八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼
大身体硬

九曰鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大
忌食鹽

十曰水洗疔其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裡黑膿汁
出中稠硬忌飲漿水并水洗

十一曰刀鏹疔其狀潤軟如莖葉狀長一寸左側肉黑
如燒烙忌刺及刀并鐵器

十二日浮嘔疔其狀瘡体貞齒少許不長而狹如薤葉
大內黃外黑其黑處刺之不痛黃處刺之痛

十三日牛狗疔其狀肉色起招不破已上十三種初
起瘡心先痒后痛先寒後熱定則寒多四肢沉重心
驚眼花嘔逆者難治惟麻子疔始末皆痒已上諸疔
切不可觸犯若觸犯之必難治者凡孝服鷄犬月經
婦人狐臭之類悉屏之須要戒怒寬懷為上策謹慎
謹慎

青
疥



青疔者根在肝發起于目下如瘤癰色青如石使人目昏無見恐悸腫卧不寧或生筋骨之間久則令人目盲或舌強語澁或脫精此症不出一年病危最急治療之方一宗于后

一方用紫花百草敷瘡上

黃弁



黃疔者脾中受熱根于胃氣邪風發于唇齒齦之邊
生色黃有水四邊麻木然發中有黃故令人多食手足
麻木涎出煩燥腹脹嗜睡不言者死未者可治形如魚
脂

赤疥



日本書紀卷之八

三

一名紅絲血箭疔

一名紅演兒

一名紫癰疽

赤疔者根在心發起千舌下世所俱赤作痛舌硬不能
言詭恍惚煩渴飲水不竭小便不通者死未者可治七
日可知禍至矣

內服救急丹

黃連解毒湯

連翹敗毒湯

馬蹄香搗碎加水取汁服之立愈

白疔

三才圖會

三



白疳者大腸虛熱根在肺起于右鼻初起如粟米大根
赤頭白或麻木或疼痛使人增寒頭重鼻口乾咽喉燥
不欲飲食如胸膈滿悶喘促昏睡者死未者可治不過
七日禍必至矣

用紫花草付瘡上

序



黑疔者勝胱虛熱根在腎發于耳前狀如癰痕色黑堅
硬使人牙關緊急腰疼脚膝不仁不然頭疼三日禍至
矣 形似蕎麥皮 用紫花苧敷瘡上
五疔者皆因喜怒憂思衝冒寒熱是以蓄其邪毒浸漬
其臟腑久而發爲疔瘡

芝麻疔



芝麻疔用黑雲膏 用紫花膏敷瘡上 走注者適身
疼不能轉動 服瀉毒流氣飲 蟾酥丸

金錠



氣疔用勝金錠

服蟾酥丸

外用紫花草敷之

火疔

五和堂精選四卷

四



火疔用勝金錠

服蟾酥丸

紫花草付瘡上

五
斤



五
佳
堂
情
趣
四
卷

四

且冷疔者高粱之變風濕餘毒天陰久令攻于膝下傳于足太陰經初生如米漸成潰爛其色如煤敗血米侵骨肉損壞遂成大患經年骨節疼痛累歲不能生肌先用艾葉蛇床子紫蘇希蓋草煎湯洗之內服黃芪白朮蒼朮當歸白芍連翹生地之藥外用隔紙膏貼之節勞內省亦可瘳矣

鉄粉散

黃丹

一兩

生鉄粉

二兩

即針砂

射香

各五

輕粉

各五

分

松香

五錢

右為末

清油調貼

瘡口上立愈

魚臍疔



春用黑雲膏 夏用蟾舌膏 秋用桐淚膏

冬用勝金錠

五種疔瘡用蟾酥丸 能治諸般惡毒疔瘡其效不可

盡述

珠砂

膽凡

各五錢

血竭

銅青

蝸牛

各一兩生用

雄黃

白凡

各一兩

輕粉

沒藥

蟾酥

各五錢

射香

少許

右十一味除珠砂蟾酥蝸牛三味將八味為末却將蝸牛蟾酥研極爛入前藥合勻并入珠砂一半在內

為丸如雞頭大又將琥珀一兩為末入
先嚼葱白三寸吐在手心內裹藥熱酒一盞吞下重
者行五里有汗出輕者車行三里有汗出立效服藥
後用厚被蓋之以出邪汗

勝金錠

人言

雄黃

硃砂

輕粉

射香

共為末用黃蠟溶化和藥成膏于水浸少時取出用
時捏餅子如錢眼大用羊骨針撥開瘡口放藥在內
用膏藥貼之仍用蟾酥丸

黑雲膏

蒼耳草連莖葉子俱用燒灰用臘月猪肝研爛成膏用厚皮紙攤貼瘡上其根自出

雞舌膏

用蝦蟇舌一箇研爛用紅絹片攤貼其根自出

瘡腫皮代絹妙

桐淚膏

梧桐淚丸如赤豆大用羊骨針揆破瘡頭放藥在內用乾麵圍四畔仍用太乙膏貼之又用茶花草付上

聖校宋寶太師瘡瘍經驗全書卷第四